


COMUNITA' TERAPEUTICA "RESIDENZA AQUILONE" - SOLOPACA (BN)

Indice del percorso riabilitativo

Nome: XY



SCALA PER LA VALUTAZIONE GLOBALE DEL FUNZIONAMENTO (VGF)	
100-91	Funzionamento superiore alla norma in un ampio spettro di attività, i problemi della vita non sembrano mai sfuggire di mano, è ricercato dagli altri per le sue numerose qualità positive. Nessun sintomo.
90-81	Sintomi assenti o minimi (esempio ansia lieve prima di un esame), buon funzionamento in tutte le aree, interessato e coinvolto in un ampio spettro di attività, socialmente efficiente, in genere soddisfatto dalla vita, nessun problema o preoccupazioni oltre a quelli della vita quotidiana (es. discussioni occasionali coi membri della famiglia).
80-71	Se sono presenti sintomi, essi rappresentano reazioni transitorie ed attendibili a stimoli psicosociali stressanti (es: difficoltà a concentrarsi dopo una discussione familiare); lievissima alterazione del funzionamento sociale, occupazionale o scolastico (es: rimanere temporaneamente indietro nello studio).
70-61	Alcuni sintomi lievi (es: umore depresso e insonnia lieve). Oppure alcune difficoltà nel funzionamento sociale, lavorativo o scolastico (es: alcune assenze ingiustificate da scuola, o furti in casa), ma in genere funziona abbastanza bene, ed ha alcune relazioni interpersonali significative.
60-51	Sintomi moderati (es: affettività appiattita e linguaggio circostanziato, occasionali attacchi di panico). Oppure moderate difficoltà nel funzionamento sociale, lavorativo e scolastico (es: pochi amici, conflitti con i compagni di lavoro).
50-41	Sintomi gravi (es: idee di suicidio, rituali ossessivi gravi, furti, ecc) oppure qualsiasi grave alterazione nel funzionamento sociale, lavorativo, scolastico (es: nessun amico, incapace di conservare un lavoro).
40-31	Alterazioni nel test di realtà o nella comunicazione (es: l'eloquio è talvolta illogico, oscuro o non pertinente). Oppure menomazione grave in alcune aree, quali il lavoro o la scuola, le relazioni familiari, la capacità di giudizio, il pensiero o l'umore (es: il depresso evita gli amici, trascura la famiglia ed è incapace di lavorare).
30-21	Il comportamento è considerevolmente influenzato da deliri o allucinazioni. Oppure grave alterazione della comunicazione o della capacità di giudizio (es: talvolta incoerente, agisce in modo grossolanamente inappropriato; idee di suicidio). Oppure incapacità di funzionare in quasi tutte le aree (es: resta a letto tutto il giorno; non ha lavoro, casa, amici).
20-11	Qualche pericolo di far del male a se stesso o agli altri (es: tentativi di suicidio senza una chiara aspettativa di morire, freatamente violento, eccitamento maniacale). Oppure occasionalmente non riesce a mantenere l'igiene personale minima (es: si sporca con le feci). Oppure grossolana alterazione della comunicazione (es: decisamente incoerente o mutacico).
10-1	Persistente pericolo di far del male in modo grave a se stesso o agli altri (es: violenza ricorrente). Oppure persistente incapacità di mantenere l'igiene personale minima. Oppure grave gesto suicida con chiara aspettativa di morire.
0	Informazioni inadeguate.